

نام: نام خانوادگی:
تاریخ: 1399/07/22

ایستگاه مهارتی



اطلاعات من در مورد حس لامسه:

میزان حساسیت حس لامسه در قسمت های مختلف بدن متفاوت است.

سوال: حداقل فاصله بین دوسوزن روی یک نقطه از پوست (آستانه ی تشخیص) چند میلیمتر باید باشد تا تیزی نوک سوزن را احساس کنیم؟

فرضیه ی من:


انجام آزمایش:

- 1- یک دایره به قطر هشت و نیم سانتی متر روی مقوا، فوم یا یونولیت بکش و مانند شکل روی آن در نقاط مشخص شده سوزن ته گرد قرار بده. (اعداد به میلیمتر فاصله ی بین سوزنهاست)
- 2- حالا روی این وسیله، که نامش تست آستانه ی تشخیص است در نقاط مشخص شده سوزن قرار بده. (یعنی کلا 20 سوزن)
3. وسیله ان آماده شده، آزمایش را شروع کن. قسمت هایی که در جدول نوشته شده خودت هم دومورد اضافه کن. یادداشت برداری: هنگام انجام آزمایش در جدول یادداشت کن.

محل آزمایش	آستانه ی تشخیص بر حسب میلی متر
بازو	
زیر چانه	
پشت گردن	
نوک انگشت دست	

نتیجه گیری:





ایستگاه تفکری

دخترم بعد از دیدن فیلم ها 3 خط از نکات مهمی که متوجه شدی بنویس.

.....

.....

.....